

BISOLVON LINCTUS SCIROPPO FLACONE 250 ML

FLACONE DA 250 ML

Bisolvon Linctus è uno sciroppo pensato per contrastare la tosse grassa, ovvero quella tosse con catarro perché agisce a livello del tessuto bronchiale e polmonare, la zona dove il catarro si presenta.

Lo sciroppo di Bisolvon svolge una triplice azione: scioglie il muco rendendolo più fluido, facilita il trasporto e l'espettorazione fino ad andare a calmare la tosse. Il principio attivo alla base di Bisolvon Sciroppo è la Bromexina, un espettorante, derivato dalla Vasicina che si trova nelle foglie della pianta "Adhatoda vasica". La particolarità di questo principio è che viene assorbito molto velocemente nel tratto gastro-intestinale per poi svolgere la sua triplice azione a livello del tessuto bronchiale raggiungendo in modo rapido il catarro. La tosse grassa, ovvero quella con catarro, è il risultato solitamente di qualcos'altro come per esempio:

- Un'infezione che può essere causata dai virus dell'influenza e del raffreddore
- Un'infezione delle mucose delle vie respiratorie
- La produzione di muco viscoso e appiccicoso in eccesso

La tosse è comunque una risposta naturale dell'organismo in quanto consiste in un meccanismo di difesa che aiuta ad espellere il catarro. Il muco che risulta denso e viscoso, si deposita lungo le vie aeree e quando ciò avviene l'organismo attiva la tosse per cercare di espellerlo. Risulta quindi molto utile e per questo non deve essere calmata ma aiutata con l'utilizzo di farmaci per poter espellere tutto il muco presente. I sintomi sono spesso sempre gli stessi ovvero:

- Un senso di costrizione, di peso al petto
- Difficoltà ad espellere il muco
- Presenza di catarro mentre si inspira o si tossisce

La tosse spesso è causata da stati infiammatori e quindi una delle principali cause è data dal contagio; per questo un ruolo di estrema importanza spetta all'igiene come il lavarsi le mani spesso perché principalmente siamo noi stessi a portarci alla bocca i virus. Diventa poi importante anche dormire il tempo necessario in quanto aiuta le difese immunitarie ad essere più forti. Come il sonno, bisogna prestare attenzione anche all'alimentazione che deve essere sana ed equilibrata, eliminare o ridurre il fumo e l'alcool. Un ruolo importante spetta anche all'inquinamento che si può trovare nelle città in quanto va ad irritare le mucose delle vie respiratorie. Un aspetto da non sottovalutare è anche l'aria presente negli ambienti che frequentiamo più spesso come per esempio la casa e il luogo di lavoro: bisogna sempre mantenere un buon grado di umidità, andando anche a cambiare spesso l'aria. L'uso di farmaci può essere un valido aiuto per eliminare il catarro e facilitare la tosse nel suo compito. I migliori farmaci in queste situazioni sono gli espettoranti e i mucolitici in quanto liberano le vie respiratorie andando a fluidificare e sciogliere il muco in eccesso. La tosse passa nel momento in cui le vie respiratorie sono libere dal muco.

Bisolvon Linctus è un mucolitico e quindi va ad incrementare la produzione del muco sieroso rendo più fluido e meno vischioso il catarro. Inoltre aiuta l'apparato respiratorio a trasportare il catarro al di fuori delle vie aeree, con questa azione in maniera autonoma la tosse sparisce.

Non contiene nè saccarosio nè fruttosio, può essere somministrato ai soggetti diabetici.

Indicazioni

Trattamento delle turbe della secrezione nelle affezioni respiratorie acute e croniche.

Controindicazioni

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti; bambini di età inferiore ai 2 anni; in caso di condizioni ereditarie che possono essere incompatibili con uno degli eccipienti; non ci sono controindicazioni assolute, ma in pazienti con ulcera gastroduodenale, se ne consiglia l'uso dopo consulto medico; controindicato durante l'allattamento.

Posologia

Si consigliano i seguenti dosaggi salvo diversa prescrizione medica. Adulti: 5 - 10 ml 3 volte al giorno. Negli adulti, all'inizio del trattamento, può essere necessario aumentare la dose totale giornaliera fino a 48 mg divisa in tre volte. Bambini di età superiore ai 2 anni: 2,5 - 5 ml 3 volte al giorno. Si consiglia l'assunzione del farmaco dopo i pasti. Lo sciroppo è somministrabile a diabetici e bambini sopra i 2 anni, non contiene fruttosio né saccarosio. Non superare le dosi consigliate. Per misurare la dose appropriata utilizzare il bicchiere dosatore inserito nella confezione (con tacche a 1,25 ml pari a 1 mg di bromexina cloridrato, 2,5 pari a 2 mg di bromexina cloridrato e 5 ml pari a 4 mg di bromexina cloridrato).

Avvertenze

Il trattamento con il medicinale comporta un aumento della secrezione bronchiale (questo favorisce l'espettorazione). Non usare per trattamenti protratti. Nel trattamento di condizioni respiratorie acute, consultare il medico se i sintomi non migliorano o peggiorano nel corso della terapia. In pochissimi casi, contemporaneamente alla somministrazione di espettoranti quali la bromexina, sono state osservate gravi lesioni della cute quali la sindrome di Stevens Johnson e la necrolisi epidermica tossica (NET). La maggior parte di queste potrebbe essere spiegata dalla gravità di malattie sottostanti o da altri farmaci assunti contemporaneamente. Inoltre nella fase iniziale della sindrome di Stevens Johnson o della necrolisi epidermica tossica (NET), i pazienti potrebbero inizialmente avvertire dei sintomi non specifici simili a quelli dell'influenza, come per esempio febbre, brividi, rinite, tosse e mal di gola. A causa di questi sintomi fuorvianti è possibile che venga intrapreso un trattamento sintomatico con una terapia per la tosse e il raffreddore. Pertanto, se si verificano nuove lesioni della cute o delle mucose interrompere precauzionalmente il trattamento con bromexina durante i successivi accertamenti. I mucolitici possono indurre ostruzione bronchiale nei bambini di età inferiore ai 2 anni. Infatti la capacità di drenaggio del muco bronchiale è limitata in questa fascia d'età, a causa delle caratteristiche fisiologiche delle vie respiratorie. Essi non devono quindi essere usati nei bambini di età inferiore ai 2 anni. Il medicinale contiene maltitolo liquido. Questo medicinale può avere un blando effetto lassativo.

Interazioni

Non sono state riportate interazioni clinicamente rilevanti con altri medicinali.

Effetti Indesiderati

Patologie del sistema immunitario, della cute, del tessuto sottocutaneo, dell'apparato respiratorio, del torace e patologie del mediastino. Frequenza non nota: reazione anafilattica compreso lo shock anafilattico, angioedema, broncospasmo, orticaria, prurito; frequenza rara: rash cutaneo e altre

reazioni da ipersensibilita'. Patologie dell'apparato gastrointestinale. Frequenza non comune: nausea, vomito, diarrea e dolore addominale superiore.

Gravidanza

Non sono stati condotti studi volti ad indagare gli effetti sulla fertilita' umana. Basandosi sull'esperienza preclinica non vi sono indicazioni di possibili effetti sulla fertilita' a seguito dell'uso della bromexina. Vi sono dati limitati sull'uso della bromexina nelle donne in gravidanza. Studi sugli animali non indicano effetti nocivi diretti o indiretti con riguardo alla tossicita' riproduttiva. Come misura precauzionale, e' preferibile evitare l'uso del farmaco durante la gravidanza. Non e' noto se la bromexina e i suoi metaboliti passino nel latte umano. I dati di farmacodinamica e tossicologia disponibili sugli animali hanno mostrato l'escrezione della bromexina e dei suoi metaboliti nel latte materno. Un rischio per i bambini allattati al seno non puo' essere escluso. Il medicinale non deve essere usato durante l'allattamento.

Bisolvon Linctus prezzo: 7,90 €