

PANTOPRAZOLO DOC Generici 20 mg compresse gastroresistenti

I foglietti illustrativi di Pantoprazolo - Farmaco Generico sono disponibili per le confezioni:

- PANTOPRAZOLO DOC Generici 20 mg compresse gastroresistenti
- PANTOPRAZOLO DOC Generici 40 mg compresse gastroresistenti

Indicazioni Perché si usa Pantoprazolo - Farmaco Generico? A cosa serve?

PANTOPRAZOLO DOC Generici 20 mg è un medicinale che riduce la produzione di [acido nello stomaco](#) (inibitore selettivo della pompa protonica). E' utilizzato per il trattamento delle malattie acido-correlate dello [stomaco](#) e dell'[intestino](#).

PANTOPRAZOLO DOC Generici 20 mg è usato per il trattamento di:

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:

- Trattamento dei [sintomi](#) (es. [pirosi](#), [rigurgito acido](#), [dolore](#) nella [deglutizione](#)) associati alla malattia da [reflusso gastroesofageo](#) causata da [reflusso](#) di acido dallo stomaco.
- Trattamento a lungo termine dell'[esofagite da reflusso](#) ([infiammazione dell'esofago](#) accompagnata da [rigurgito](#) di acido dallo stomaco) e prevenzione del suo ripresentarsi.

Adulti:

- Prevenzione delle [ulcere duodenali](#) e dello stomaco causate da [farmaci antinfiammatori non steroidei \(FANS\)](#), per esempio, [ibuprofene](#)) in pazienti a rischio che necessitano di un trattamento continuativo con FANS.

Controindicazioni Quando non dev'essere usato Pantoprazolo - Farmaco Generico

Non prenda PANTOPRAZOLO DOC Generici 20 mg

- Se è allergico (ipersensibile) al pantoprazolo, alla [lecitina di soia](#) o ad uno qualsiasi degli altri componenti di PANTOPRAZOLO DOC Generici 20 mg (elencati al paragrafo 6)
- Se è allergico a medicinali contenenti altri [inibitori della pompa protonica](#)

Precauzioni per l'uso Cosa serve sapere prima di prendere Pantoprazolo - Farmaco Generico

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere PANTOPRAZOLO DOC Generici.

Faccia particolare attenzione con PANTOPRAZOLO DOC Generici 20 mg

- Se ha gravi [problemi al fegato](#). Informi il medico se ha avuto in passato [problemi epatici](#). Il medico disporrà un più frequente controllo dei suoi [enzimi epatici](#), specialmente se lei sta assumendo PANTOPRAZOLO DOC Generici 20 mg per una terapia a lungo termine. In caso di [aumento degli enzimi epatici](#) il trattamento deve essere sospeso.
- Se ha bisogno di trattamento continuativo con FANS ed assume PANTOPRAZOLO DOC Generici 20 mg perché presenta un aumentato rischio di sviluppare complicanze [gastriche](#) ed intestinali. Ogni accresciuto rischio sarà valutato in base ai suoi personali fattori di rischio quali l'età (65 anni ed oltre), un'esperienza di [ulcere gastriche](#) o duodenali o di [sanguinamento](#) gastrico o intestinale.
- Se ha ridotte riserve corporee o fattori di rischio per ridotta [vitamina B12](#) ed è sottoposto ad un trattamento a lungo termine con pantoprazolo. Come con tutti gli agenti che riducono l'acidità, pantoprazolo può portare ad un ridotto assorbimento della vitamina B12.
- Se contemporaneamente a pantoprazolo sta assumendo un medicinale contenente atazanavir (per il trattamento dell'infezione da HIV), chiedi al medico per un consiglio

specifico.

- Se assume un inibitore di pompa protonica come PANTOPRAZOLO DOC Generici, specialmente per un periodo superiore ad un anno, si potrebbe verificare un lieve aumento del rischio di **fratture** dell'**anca**, del polso o della **colonna vertebrale**. Se soffre di **osteoporosi** o sta assumendo **corticosteroidi** (che possono aumentare il **rischio di osteoporosi**) consulti il suo medico.

Informi immediatamente il medico se rileva qualcuno dei seguenti sintomi:

- una involontaria riduzione di **peso**
- vomito** ricorrente
- difficoltà nella deglutizione
- presenza di **sangue nel vomito**
- appare **pallido** e si sente debole (**anemia**)
- presenza di **sangue nelle feci**
- diarrea grave** e/o persistente, perché PANTOPRAZOLO DOC Generici 20 mg è stato associato ad un modesto aumento della **diarrea** infettiva.

Il medico potrebbe decidere che lei necessiti di effettuare alcuni test per escludere una malattia maligna in quanto pantoprazolo allevia anche i sintomi del **cancro** e potrebbe causare un ritardo nella diagnosi. Se i suoi sintomi persistono nonostante il trattamento, devono essere considerate ulteriori indagini.

Se prende PANTOPRAZOLO DOC Generici 20 mg per un trattamento a lungo termine (superiore ad 1 anno) il medico la terrà probabilmente sotto regolare controllo. Deve riferire ogni sintomo e circostanza nuova o eccezionale ogniqualvolta incontra il medico.

Interazioni Quali farmaci o alimenti possono modificare l'effetto di Pantoprazolo - Farmaco Generico

PANTOPRAZOLO DOC Generici 20 mg può influenzare l'efficacia di altri medicinali, così informi il medico se sta assumendo

- Medicinali quali **ketoconazolo**, **itraconazolo** e **posaconazolo** (utilizzati per trattare **infezioni fungine**) o **erlotinib** (utilizzato per alcuni tipi di cancro) poiché PANTOPRAZOLO DOC Generici 20 mg può impedire a questi e ad altri medicinali di agire correttamente.
- Warfarin** e fenprocumone, che influenzano l'addensamento, o la diluizione del sangue. Lei può avere bisogno di ulteriori controlli.
- Atazanavir (usato per trattare l'infezione da HIV).

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Avvertenze È importante sapere che:

Gravidanza e allattamento

Non vi sono dati adeguati riguardanti l'uso del pantoprazolo in donne in gravidanza. E' stata riportata escrezione nel **latte materno** umano. Se lei è in stato di gravidanza, o pensa di poterlo essere, o sta **allattando al seno**, deve usare questo medicinale solo se il medico considera il beneficio per lei maggiore del rischio potenziale per il **feto** o il **lattante**.

Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Se manifesta effetti indesiderati quali **capogiro** o **disturbi della vista**, non deve guidare o usare macchinari.

Informazioni importanti su alcuni componenti di PANTOPRAZOLO DOC Generici 20 mg

Se il suo medico le ha detto che ha un'**intolleranza** ad alcuni **zuccheri**, contatti il suo medico prima di prendere questo medicinale.

PANTOPRAZOLO DOC Generici 20 mg contiene lecitina di soia. Se è allergico alle [arachidi](#) o alla soia, non utilizzi questo medicinale.

Dose, Modo e Tempo di Somministrazione

Come usare Pantoprazolo - Farmaco Generico: Posologia

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Quando e come deve prendere PANTOPRAZOLO DOC Generici 20 mg?

Prenda le compresse 1 ora prima di un pasto senza masticarle o frantumarle e le deglutisca intere con un po' di [acqua](#).

A meno che non venga informato diversamente dal medico, la dose raccomandata è:

Adulti e adolescenti di 12 anni ed oltre

Per il trattamento dei sintomi associati a disturbi del reflusso gastroesofageo (es. pirosi, rigurgito acido, dolore nella deglutizione)

La dose raccomandata è una compressa al giorno. Questa dose normalmente porta sollievo in 2 - 4 settimane - al massimo dopo altre 4 settimane. Il medico le dirà per quanto tempo continuare l'assunzione del medicinale. Dopo di che ogni ripresentarsi dei sintomi può essere controllato assumendo una compressa al giorno, al bisogno.

Per il trattamento a lungo termine e per la prevenzione del ripresentarsi dell'esofagite da reflusso

La dose raccomandata è una compressa al giorno. Se il sintomo ritorna, il medico può raddoppiare la dose, in tal caso può invece utilizzare PANTOPRAZOLO DOC Generici 40 mg compresse, una al giorno. Dopo la guarigione, si può ridurre la dose tornando ad una compressa da 20 mg al giorno.

Adulti

Per la prevenzione delle ulcere duodenali e gastriche in pazienti che necessitano di un trattamento continuativo con FANS La dose raccomandata è una compressa al giorno.

Particolari gruppi di pazienti:

- Se soffre di gravi problemi epatici, non deve assumere più di una compressa da 20 mg al giorno.
- Uso nei bambini sotto i 12 anni. Queste compresse non sono raccomandate per l'uso nei bambini al di sotto dei 12 anni.

Sovradosaggio

Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di Pantoprazolo - Farmaco Generico

Se prende più PANTOPRAZOLO DOC Generici 20 mg di quanto deve

Consulti il medico o il farmacista. Non sono noti sintomi da sovradosaggio.

Se dimentica di prendere PANTOPRAZOLO DOC Generici 20 mg

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose. Prenda la normale dose successiva al momento previsto.

Se interrompe il trattamento con PANTOPRAZOLO DOC Generici 20 mg

Non interrompa il trattamento con queste compresse senza prima aver consultato il medico o il farmacista.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista

Effetti Indesiderati

Quali sono gli effetti collaterali di Pantoprazolo - Farmaco Generico

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

La frequenza dei possibili effetti indesiderati sotto elencati è definita utilizzando la seguente convenzione

- molto comune (interessa più di 1 paziente su 10)
- comune (interessa da 1 a 10 pazienti su 100)
- non comune (interessa da 1 a 10 pazienti su 1.000)
- raro (interessa da 1 a 10 pazienti su 10.000)
- molto raro (interessa meno di 1 paziente su 10.000)
- non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

Se avverte uno dei seguenti effetti indesiderati, interrompa il trattamento con queste compresse e consulti il medico immediatamente, o contatti il pronto soccorso dell'ospedale più vicino:

- Reazioni allergiche** serie (frequenza rara): **gonfiore della lingua** e/o della gola, difficoltà nella deglutizione, **orticaria**, difficoltà nella **respirazione**, gonfiore allergico al volto (**edema di Quincke/angioedema**), grave capogiro con **battito cardiaco** molto veloce e forte **sudorazione**
- Patologie serie della cute** (frequenza non nota): comparsa di **vesciche** cutanee e deperimento rapido delle sue condizioni generali, erosione (inclusa lieve **emorragia**) degli **occhi**, naso, bocca/**labbra** o genitali (**sindrome** di Stevens-Johnson, **sindrome di Lyell**, **Eritema multiforme**) e sensibilità alla luce
- Altre patologie serie** (frequenza non nota): **ingiallimento della pelle** o del bianco degli occhi (severo danno alle **cellule epatiche**, **ittero**) o **febbre**, eruzione cutanea, e ingrossamento dei **reni** talvolta con dolore ad **urinare** o **dolore lombare** (grave infiammazione dei reni)

Altri effetti indesiderati sono:

- Non Comune (interessa da 1 a 10 pazienti su 1.000) **cefalea**; capogiro; diarrea; senso di **nausea**, vomito; **distensione addominale** e **flatulenza** (aria); **stipsi**; **bocca secca**; **dolore addominale** e sensazione di malessere; eruzione cutanea, **esantema**, eruzione; **prurito**; sensazione di debolezza, **spossatezza** o malessere generale; **disturbi del sonno**
- Raro (interessa da 1 a 10 pazienti su 10.000) disturbi della vista come annebbiamento; orticaria; **dolore alle articolazioni**; **dolori muscolari**; **variazioni di peso**; aumento della **temperatura corporea**; gonfiore delle estremità (edema periferico); reazioni allergiche; **depressione**, aumento del volume della mammella negli uomini
- Molto Raro (interessa meno di 1 paziente su 10.000) disorientamento - Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili): **Allucinazioni**, **confusione** (specialmente nei pazienti con un'esperienza di questi sintomi); diminuzione dei livelli di **sodio** nel sangue

Effetti indesiderati identificati attraverso le **analisi del sangue**:

- Non Comune (interessa da 1 a 10 pazienti su 1.000) un aumento degli enzimi epatici
- Raro (interessa da 1 a 10 pazienti su 10.000) un aumento della **bilirubina**; aumento dei **grassi** nel sangue
- Molto Raro (interessa meno di 1 paziente su 10.000) una riduzione del numero delle **piastrine**, che può causare sanguinamento o **ecchimosi** più del normale; una riduzione del numero dei **globuli bianchi**, che può portare a infezioni più frequenti

Non nota: Se assume PANTOPRAZOLO DOC Generici per più di tre mesi, è possibile che i livelli **ematici** di **magnesio** diminuiscano. Bassi livelli di **magnesio** possono manifestarsi con affaticamento, **contrazioni muscolari** involontarie, disorientamento, **convulsioni**, **vertigini**, aumento della **frequenza cardiaca**. Se ha qualcuno di questi sintomi consulti immediatamente il suo medico. Bassi livelli di magnesio possono anche comportare una riduzione dei livelli ematici di **potassio** o **calcio**. Il medico dovrebbe decidere se controllare periodicamente i livelli di magnesio nel sangue.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato all'indirizzo www.aifa.gov.it/responsabili

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

Scadenza e Conservazione

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola, sul flacone e sul blister dopo "SCAD". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Per le compresse confezionate nei flaconi di plastica: PANTOPRAZOLO DOC Generici 20 mg può essere usato per tre mesi dopo la prima apertura del contenitore.

Questo medicinale non richiede alcuna particolare condizione di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici.. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente

Cosa contiene PANTOPRAZOLO DOC Generici 20 mg:

Il **principio attivo** è: pantoprazolo.

Ogni compressa gastroresistente contiene 20 mg di pantoprazolo (come pantoprazolo sodico sesquidrato).

Gli altri componenti sono:

Nucleo della compressa

Maltitolo (E 965), crospovidone tipo B, carmellosa sodica, sodio carbonato anidro (E 500), calcio stearato

Rivestimento della compressa

Polivinilalcol, **talco** (E 553b), titanio diossido (E 171), macrogol 3350, lecitina di soia, ossido di **ferro** giallo (E 172), sodio carbonato anidro (E 500), copolimero acido metacrilico-etil acrilato (1:1), **trietil citrato** (E 1505)

Descrizione dell'aspetto di PANTOPRAZOLO DOC Generici 20 mg e contenuto della confezione:

Le compresse gastroresistenti di PANTOPRAZOLO DOC Generici 20 mg sono ovali e gialle.

PANTOPRAZOLO DOC Generici 20 mg è disponibile in confezioni da 7, 10, 14, 15, 20, 28, 28 (2X14), 30, 50, 56, 60, 98, 100 compresse per il confezionamento in blister e da 14, 28, 100 compresse per il confezionamento in contenitore HDPE.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Fonte Foglietto Illustrativo: AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). Contenuto pubblicato a Gennaio 2016. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'**AIFA** (Agenzia Italiana del Farmaco). [Disclaimer e informazioni utili](#).

Tratto da https://www.my-personaltrainer.it/Foglietti-illustrativi/Pantoprazolo_-_Farmaco_Generico.html