

Ramipril - Farmaco Generico - Foglio Illustrativo

Indicazioni Perché si usa Ramipril - Farmaco Generico? A cosa serve?

RAMIPRIL DOC Generici contiene un medicinale chiamato ramipril che appartiene al gruppo di farmaci chiamati **ACE inibitori** (Inibitori dell'**Enzima di Conversione dell'Angiotensina**).

RAMIPRIL DOC Generici agisce:

- Diminuendo la produzione, da parte del corpo, di sostanze che possono causare un aumento della **pressione sanguigna**
- Rilassando** e allargando i suoi **vasi sanguigni**
- Facilitando il suo **cuore** nel pompare il **sangue** in circolo nel corpo.

RAMIPRIL DOC Generici può essere usato:

- Per trattare la **pressione alta** del sangue (**ipertensione**)
- Per ridurre il rischio o ritardare il peggioramento di problemi renali (in presenza o meno di **diabete**)
- Per trattare il suo cuore quando non riesce a pompare un sufficiente **volume di sangue** nel resto del corpo (**insufficienza cardiaca**)
- Come trattamento dopo un attacco cardiaco (**infarto del miocardio**) se associato ad insufficienza cardiaca.

Controindicazioni Quando non dev'essere usato Ramipril - Farmaco Generico

Non prenda RAMIPRIL DOC Generici:

- Se è allergico (ipersensibile) al ramipril, ad altri farmaci ACE inibitori o uno qualsiasi degli altri eccipienti di RAMIPRIL DOC Generici elencati al paragrafo 6.
- Segni** di una **reazione allergica** possono essere eruzioni cutanee, difficoltà ad inghiottire o a respirare, gonfiore alle **labbra**, alla faccia, alla gola o alla lingua
- Se ha avuto una reazione **allergica** grave chiamata "**angioedema**". Questi segni includono **prurito**, eruzione cutanea (**orticaria**), **macchie** rosse sulle **mani**, sui **piedi** e in gola, gonfiore della gola e della lingua, gonfiore attorno agli **occhi** e delle labbra, difficoltà nel respirare e ad inghiottire
- Se è in **dialisi** o sta subendo qualche altro tipo di filtrazione del sangue. A seconda del macchinario che viene utilizzato, RAMIPRIL DOC Generici può non essere adatto per lei
- Se ha problemi renali dovuti a insufficiente apporto di sangue al **rene** (**stenosi dell'arteria renale**).
- Durante gli ultimi 6 mesi di **gravidanza** (vedere il paragrafo sotto "Gravidanza e allattamento")
- Se la pressione sanguigna è eccessivamente bassa o instabile. Il medico dovrà fare questa valutazione.

Non prenda RAMIPRIL DOC Generici se si verifica una delle condizioni sopra descritte. Se non è sicuro, chieda al medico prima di assumere RAMIPRIL DOC Generici.

Precauzioni per l'uso Cosa serve sapere prima di prendere Ramipril - Farmaco Generico

Faccia particolare attenzione con RAMIPRIL DOC Generici Controlli con il medico o farmacista prima di prendere RAMIPRIL DOC Generici:

- Se ha problemi di cuore, **fegato** o **reni**
- Se ha perso molti **sali** o fluidi corporei (a causa di uno stato di malessere quale **vomito**, **diarrea**, **sudorazione eccessiva**, o in seguito ad una dieta povera di **sale**, o per

l'assunzione di **diuretici** orali per un lungo periodo di tempo o avendo subito una dialisi)

- Se sta per sottoporsi ad un trattamento per ridurre l'**allergia** alle punture delle api o delle **vespe** (desensibilizzazione)
- Se sta per subire un'anestesia. Questa può essere somministrata per un intervento chirurgico o un intervento ai **denti**. Potrebbe essere necessario interrompere il trattamento con RAMIPRIL DOC Generici il giorno prima, chiedi consiglio al medico
- Se ha un elevato quantitativo di **potassio** nel sangue (evidenziato da un **esame del sangue**)
- Se ha una patologia del **collagene** vascolare come **sclerodermia** o **lupus eritematoso sistemico**.
- Deve informare il medico se pensa di essere incinta (o di poterlo diventare). RAMIPRIL DOC Generici non è raccomandato durante il **primo trimestre di gravidanza** e può causare gravi danni al bambino dopo i primi tre mesi di gravidanza, vedere paragrafo "Gravidanza e allattamento".

Bambini

L'uso di RAMIPRIL DOC Generici non è raccomandato in bambini ed adolescenti al di sotto dei 18 anni di età perché non ci sono informazioni disponibili per questa popolazione.

Se si verifica una delle condizioni sopra descritte (o non è sicuro), chiedi al medico prima di assumere RAMIPRIL DOC Generici.

Interazioni Quali farmaci o alimenti possono modificare l'effetto di Ramipril - Farmaco Generico

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, compresi quelli senza prescrizione medica (inclusi i medicinali a base di **piante medicinali**). Questo perché RAMIPRIL DOC Generici può influenzare il meccanismo d'azione di alcuni altri medicinali. Inoltre alcuni medicinali possono influenzare il meccanismo d'azione di RAMIPRIL DOC Generici.

Informi il medico se sta assumendo uno dei seguenti medicinali. Tali medicinali possono interferire con RAMIPRIL DOC Generici alterandone l'azione:

- Medicinali utilizzati per alleviare dolori ed infiammazioni (ad es. **Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei (FANS)** come **ibuprofene**, **indometacina**, **aspirina**)
- Medicinali utilizzati per il trattamento della **pressione bassa**, dello shock, dell'insufficienza cardiaca, dell'**asma** o delle **allergie** come **efedrina**, **noradrenalina** o **adrenalina**. Il medico dovrà controllare la sua pressione sanguigna.

Informi il medico se sta assumendo uno dei seguenti medicinali. Tali medicinali, se assunti con RAMIPRIL DOC Generici, possono aumentare la probabilità che si verifichino effetti indesiderati:

- Medicinali utilizzati per alleviare dolori ed infiammazioni (ad es. **Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei (FANS)** come **ibuprofene**, **indometacina**, **aspirina**)
- Medicinali per la cura del **cancro (chemioterapia)**
- Medicinali per evitare il rigetto di organi dopo il trapianto come ad esempio la **ciclosporina**
- Diuretici come la **furosemide**
- Medicinali che possono aumentare il quantitativo di potassio nel sangue come lo **spironolattone**, il **triamterene**, l'**amiloride**, i **sali di potassio** e l'**eparina** (usata per rendere il sangue più fluido)
- Medicinali steroidei per il trattamento delle infiammazioni come il **prednisolone**
- Allopurinolo** (usato per abbassare il contenuto di **acido urico** nel sangue)
- Procainamide** (per i problemi di **battito cardiaco**)
- Vildagliptin** (un medicinale orale per abbassare il **glucosio**)

Informi il medico se sta assumendo uno dei seguenti medicinali. Il meccanismo d'azione di questi medicinali può essere influenzato da RAMIPRIL DOC Generici:

- Farmaci per il **diabete** come gli **ipoglicemizzanti orali** e l'**insulina**. RAMIPRIL DOC Generici può abbassare il quantitativo di **zuccheri nel sangue**. Controlli attentamente il livello degli **zuccheri** nel sangue quando assume RAMIPRIL DOC Generici.
- Litio** (per problemi psichiatrici). RAMIPRIL DOC Generici può aumentare il quantitativo di litio nel sangue. Il livello di litio nel suo sangue deve essere controllato attentamente dal medico.

Se si verifica una delle condizioni sopra descritte (o non è sicuro), chiedi al medico prima di assumere RAMIPRIL DOC Generici.

Assunzione di RAMIPRIL DOC Generici con **cibi** e **alcol**

- Bere bevande alcoliche** insieme a RAMIPRIL DOC Generici può provocare sensazione di **vertigini** o di stordimento. Se vuole sapere quanto alcool bere quando sta prendendo RAMIPRIL DOC Generici ne discuta con il medico, poiché i farmaci usati per ridurre la pressione sanguigna e l'alcool possono avere effetti **additivi**.
- L'assunzione di RAMIPRIL DOC Generici può avvenire insieme o lontano dai pasti.

AvvertenzeÈ importante sapere che:

Gravidanza e allattamento

Deve informare il medico se pensa di essere incinta (o di poterlo diventare).

Non deve prendere RAMIPRIL DOC Generici nelle prime 12 settimane di gravidanza e non deve assolutamente assumerlo dopo la 13a settimana perché il suo utilizzo potrebbe essere dannoso per il bambino.

Se rimane incinta durante la terapia con RAMIPRIL DOC Generici, informi immediatamente il medico. Prima della pianificazione di una gravidanza deve essere effettuato il passaggio ad un altro farmaco.

Non deve prendere RAMIPRIL DOC Generici se sta allattando.

Chiedi al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Potrebbe avere sensazione di vertigini, mentre assume RAMIPRIL DOC Generici. Questo è più probabile quando ha appena iniziato ad assumere RAMIPRIL DOC Generici o ha appena aumentato la dose. Se ciò dovesse accadere, non guidi o usi strumenti o macchinari.

Informazioni importanti su alcuni eccipienti di RAMIPRIL DOC Generici

RAMIPRIL DOC Generici contiene uno **zucchero** del **latte (lattosio)**.

Contatti il suo medico prima di usare questo medicinale se le è stato detto che non tollera certi tipi di zuccheri.

Dose, Modo e Tempo di SomministrazioneCome usare Ramipril -

Farmaco Generico: Posologia

Prenda sempre RAMIPRIL DOC Generici seguendo esattamente le istruzioni del medico. Deve chiedere il parere del medico o del farmacista se non è sicuro.

Prendendo questo medicinale

- Prenda il farmaco per bocca nello stesso momento della giornata, ogni giorno
- Inghiotta le compresse intere con del liquido.
- Non rompa le compresse e non le mastichi.

Quanto ne deve prendere

Trattamento della pressione alta

- La dose iniziale abituale è 1,25 mg o 2,5 mg una volta al giorno.
- Il medico aggiusterà il quantitativo che lei assume finché la sua pressione sanguigna sarà sotto controllo.
- La dose massima giornaliera è 10 mg.

- Se sta già prendendo dei diuretici, il medico potrebbe interromperli o ridurne il quantitativo prima di farle iniziare il trattamento con RAMIPRIL DOC Generici. Trattamento per ridurre o prevenire l'aggravamento dei problemi renali
- Può esserle data per iniziare una dose di 1,25 mg o 2,5 mg una volta al giorno
- Il medico adeguerà il quantitativo che sta assumendo.
- La dose abituale è 5 mg o 10 mg una volta al giorno.

Trattamento dell'insufficienza cardiaca

- La dose iniziale abituale è 1,25 mg una volta al giorno.
- Il medico adeguerà il quantitativo che assume.
- La dose massima è 10 mg al giorno. E' preferibile dividere la dose in due somministrazioni giornaliere.

Trattamento dopo un attacco cardiaco

- La dose iniziale abituale è da 1,25 mg una volta al giorno a 2,5 mg due volte al giorno.
- Il medico adeguerà il quantitativo che assume.
- La dose abituale è 10 mg al giorno. E' preferibile dividere la dose in due somministrazioni giornaliere.

Anziani

Il medico ridurrà la dose iniziale e adeguerà il trattamento più lentamente.

Sovradosaggio Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di Ramipril - Farmaco Generico

Se prende più RAMIPRIL DOC Generici di quanto deve

Informi il medico o vada al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Non guidi per andare all'ospedale, si faccia accompagnare da qualcuno o chiami un'ambulanza. Porti con sé la scatola del medicinale. Questo perché il medico deve sapere che cosa ha assunto.

Se dimentica di prendere RAMIPRIL DOC Generici

- Se dimentica una dose, assuma la sua dose normale, quando è il momento.
- Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

Se ha ulteriori domande sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

Effetti Indesiderati Quali sono gli effetti collaterali di Ramipril - Farmaco Generico

Come tutti i medicinali, RAMIPRIL DOC Generici può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Smetta di prendere RAMIPRIL DOC Generici e si rivolga immediatamente al medico se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato grave - potrebbe avere bisogno di un trattamento medico urgente:

- Gonfiore del volto, delle labbra o della gola tale da rendere difficoltoso **deglutire** o respirare, così come **prurito** o eruzione cutanea. Questo potrebbe essere **segno** di una reazione allergica grave a RAMIPRIL DOC Generici.
- Reazioni cutanee gravi che includono eruzione cutanea, ulcere in bocca, peggioramento di una patologia cutanea pre-esistente, arrossamenti, formazione di **vesciche** e **desquamazione della pelle** (come **Sindrome** di Stevens-Johnson, necrosi **epidermica** tossica o **eritema multiforme**).

Informi il suo medico immediatamente se Lei manifesta:

- Accelerazione del battito cardiaco**, **battito cardiaco irregolare** o rinforzato (**palpitazioni**), **dolore al petto**, sensazione di oppressione al petto, o problemi più gravi che includono attacco cardiaco e **ictus**
- Respiro corto** o **tosse**. Questi possono essere segni di problemi polmonari

- Formazione più facile di **lividi**, **sanguinamento** prolungato più del normale, qualsiasi segno di sanguinamento (ad es. **sanguinamento delle gengive**) macchie viola sulla **pelle** o facilitata insorgenza di infezioni, irritazioni della gola e **febbre**, sensazione di stanchezza, debolezza, **capogiri** o colorito **pallido**. Questi possono essere segni di problemi circolatori o del **midollo osseo**
- Dolore** gastrico grave che può estendersi fino alla **schiena**. Questo può essere un segno di **pancreatite** (infiammazione del **pancreas**)
- Febbre, **brividi**, stanchezza, perdita dell'**appetito**, **dolore allo stomaco**, sensazione di malessere, **ingiallimento della pelle** o degli occhi (**ittero**). Questi possono essere segni di **problemi al fegato** come l'**epatite** (infiammazione del fegato) o danno al fegato.

Altri effetti indesiderati includono:

Informi il medico se una delle condizioni di seguito descritte diventa grave o permane per un tempo più lungo di qualche giorno:

Comuni (interessano meno di 1 paziente ogni 10 pazienti in terapia)

- Mal di testa** o sensazione di stanchezza
- Sensazione di vertigini. Questo è più probabile che accada quando la terapia con RAMIPRIL DOC Generici è appena iniziata o ha appena incrementato la dose
- Debolezza, **ipotensione** (pressione sanguigna insolitamente bassa), specialmente quando si è in piedi o ci si alza rapidamente
- Tosse secca** stizzosa, infiammazione dei seni nasali (**sinusite**) o **bronchite**, **fiato corto**
- Dolore allo **stomaco** o all'**intestino**, diarrea, **indigestione**, sensazione di malessere o stato di malessere
- Eruzione cutanea con o senza rigonfiamenti
- Dolori al petto
- Crampi** o **dolori muscolari**
- Gli **esami del sangue** mostrano un livello di potassio più elevato del normale.

Non comuni (interessano meno di 1 paziente ogni 100 pazienti in terapia)

- Problemi di equilibrio (vertigini)
- Prurito e sensazioni insolite alla pelle come intorpidimento, formicolio, bruciore, sensazione di punture o di sfregamento (**parestesia**)
- Perdita o cambiamento del **gusto**
- Problemi di **sonno**
- Umore **depresso**, **ansia**, maggiore **nervosismo** rispetto al solito o irritabilità
- Naso chiuso**, difficoltà respiratorie o peggioramento dell'asma
- Gonfiore all'intestino chiamato "angioedema intestinale" e che si presenta con **sintomi** come **dolore addominale**, vomito e diarrea
- Bruciore allo stomaco**, **stipsi** o **secchezza delle fauci**
- Aumento della quantità di **urina** durante la giornata
- Maggiore sudorazione rispetto al solito
- Perdita o **diminuzione dell'appetito** (anoressia)
- Battito cardiaco accelerato o irregolare.
- Braccia e **gambe gonfie**. Questo può essere il segno che il suo corpo sta trattenendo più **acqua** del solito
- Vampate**
- Visione** confusa
- Dolore alle articolazioni**
- Febbre
- Impotenza** nel maschio, ridotto desiderio sessuale in uomini e donne
- Aumento nel numero delle **cellule** bianche del sangue (**eosinofilia**) riscontrato durante

gli **esami** del sangue

•Alterazioni della funzionalità di fegato, pancreas o reni evidenziate da **analisi del sangue**.

Rari (interessano meno di 1 paziente ogni 1000 pazienti in terapia)

- Sensazione di mancamento o **confusione**
- Lingua gonfia** ed arrossata
- Grave sfaldamento o desquamazione della pelle, prurito, eruzione cutanea caratterizzata da **pustole**
- Problemi alle **unghie** (come perdita o separazione dell'**unghia** dalla sua sede)
- Eruzione cutanea o lividi
- Macchie sulla pelle** ed **estremità fredde**
- Occhi arrossati**, gonfi o acquosi o con prurito
- Disturbi dell'udito e tintinnio nell'**orecchio**
- Sensazione di debolezza
- Diminuzione nel numero dei **globuli rossi**, bianchi e delle **piastrine** del sangue o della concentrazione dell'**emoglobina**, evidenziato da esami del sangue.

Molto rari (interessano meno di 1 paziente ogni 10000 pazienti in terapia)

- Maggiore sensibilizzazione al sole.

Altri effetti indesiderati riscontrati:

Informi il medico se una delle condizioni di seguito descritte diventa grave o permane per un tempo più lungo di qualche giorno.

- Difficoltà di concentrazione
- Gonfiore alla bocca
- Esami del sangue che mostrano un numero troppo basso di **cellule del sangue**.
- Esami del sangue che mostrano un basso livello del **sodio** nel sangue
- Dita delle mani** e dei piedi che cambiano colore quando si raffreddano e che formicolano o fanno male quando vengono riscaldate (**fenomeno di Raynaud**)
- Aumento del volume **del seno** negli uomini
- Reazioni rallentate o alterate
- Sensazione di bruciore
- Modifica nella percezione degli odori
- Perdita dei capelli**.

Se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio, informi il medico o il farmacista.

Scadenza e Conservazione

Tenere RAMIPRIL DOC Generici fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Non usi RAMIPRIL DOC Generici dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Cosa contiene RAMIPRIL DOC Generici

Il **principio attivo** è il ramipril.

Gli eccipienti sono: sodio idrogeno carbonato, lattosio monoidrato, croscarmellosa sodica, **amido** pregelatinizzato, sodio stearil fumarato, **ferro** ossido giallo (E172) (solo nelle compresse da 2,5 e 5mg), ferro ossido rosso (E172) (solo nelle compresse da 5mg).

Descrizione dell'aspetto di RAMIPRIL DOC Generici e contenuto della confezione

Compresse

Confezioni da 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 e 100 compresse in blister Al/Al.

(È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate).

Aspetto delle compresse:

2,5 mg: compresse gialle, a forma di capsula, non rivestite, piatte, 10,0 x 5,0 mm, con linea di frattura su di un lato e sui fianchi, con impresso "R2".

5 mg: compresse rosa, a forma di capsula, non rivestite, piatte, 8,8 x 4,4 mm, con linea di frattura su di un lato e sui fianchi, con impresso "R3".

10 mg: compresse bianco-biancastre, a forma di capsula, non rivestite, piatte, 11,0 x 5,5 mm con linea di frattura su di un lato e sui fianchi, con impresso "R4".

Fonte Foglietto Illustrativo: AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). Contenuto pubblicato a Gennaio 2016. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'[AIFA](#) (Agenzia Italiana del Farmaco). [Disclaimer e informazioni utili](#).

Tratto da https://www.my-personaltrainer.it/Foglietti-illustrativi/Ramipril_-_Farmaco_Generico.html