

TAMSULOSIN DOC Generici 0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato

Indicazioni Perché si usa Tamsulosin? A cosa serve?

Il **principio attivo** di TAMSULOSIN DOC Generici è la **tamsulosina**. La tamsulosina è un farmaco ad azione selettiva antagonista degli adrenorecettori $\alpha 1A/\alpha 1D$ che riduce la **contrazione muscolare** a livello della **prostata** e dell'**uretra**; ciò agevola il flusso dell'**urina** attraverso l'uretra e facilita la **minzione** (espulsione dell'urina - urinare). In aggiunta esso diminuisce la sensazione di urgenza ad urinare.

TAMSULOSIN DOC Generici viene usato nell'uomo per il trattamento dei **sintomi** delle basse **vie urinarie** associati ad **Iperplasia Prostatica Benigna** (IPB, ossia l'**ingrossamento della prostata**). Questi disturbi possono includere **difficoltà ad urinare** (riduzione del getto), gocciolamento, urgenza e necessità di urinare frequentemente sia di giorno che di notte.

Controindicazioni Quando non dev'essere usato Tamsulosin

Non usi TAMSULOSIN DOC Generici:

- se è allergico alla tamsulosina cloridrato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6). L'ipersensibilità o l'**allergia** alla tamsulosina cloridrato si può manifestare come un improvviso gonfiore locale dei tessuti molli corporei (ad es. gola o lingua) e di **mani** o **piedi**, difficoltà di **respirazione** e/o **prurito** ed eruzioni cutanee (**angioedema**).
- se ha svenimenti per un abbassamento della **pressione sanguigna** quando cambia posizione (mettendosi a sedere da sdraiato o alzandosi in piedi).
- se soffre di gravi **problemi epatici**.

Precauzioni per l'uso Cosa serve sapere prima di prendere Tamsulosin

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare TAMSULOSIN DOC Generici.

- Controlli medici periodici sono necessari per controllare lo sviluppo della condizione per la quale lei è trattato.
- Raramente con l'uso di TAMSULOSIN DOC Generici può presentarsi **svenimento**, così come con altri medicinali di questo tipo. Ai primi **segni** di **giramento di testa** o di debolezza deve sedersi o sdraiarsi fino alla loro scomparsa.
- Se soffre di gravi problemi renali, informi il medico.
- se durante l'utilizzo di tamsulosina ha avvertito un improvviso gonfiore locale dei tessuti molli corporei (ad es. gola o lingua) e delle mani e/o dei piedi, difficoltà respiratorie e/o **prurito** ed eruzioni cutanee, la cui causa è una **reazione allergica** (angioedema), informi il medico.
- se si deve sottoporre o se è in lista per un intervento chirurgico agli **occhi** per opacità del cristallino (**cataratta**) o **aumento della pressione** dell'**occhio** (**glaucoma**), informi il suo oculista se ha precedentemente assunto, sta assumendo o ha intenzione di assumere TAMSULOSIN DOC Generici perché potrebbe insorgere una condizione dell'occhio chiamata "**sindrome** intraoperatoria dell'**iride** a bandiera" (IFIS). Lo specialista potrà di conseguenza adottare le precauzioni più appropriate in merito ai trattamenti farmacologici e alla tecnica chirurgica da utilizzare. Chieda al suo medico se deve rimandare o sospendere temporaneamente l'assunzione di questo medicinale prima di sottoporsi a un intervento chirurgico agli occhi per opacità del cristallino (cataratta) o aumento della pressione dell'occhio (glaucoma).

Consulti il suo medico se si trova o se si è trovato in passato in una delle situazioni sopra descritte.

Bambini

Non somministrare questo medicinale a bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni perché il medicinale non è efficace in questa popolazione.

Interazioni Quali farmaci o alimenti possono modificare l'effetto di Tamsulosin

Altri medicinali e TAMSULOSIN DOC Generici

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale. L'assunzione di TAMSULOSIN DOC Generici 0.4 mg con altri medicinali della stessa classe (antagonisti degli adrenorecettori α_1) può determinare un calo non voluto della pressione sanguigna. **Diclofenac** (un medicinale antinfiammatorio usato per combattere dolori di varia natura) e **warfarina** (utilizzata per prevenire la **coagulazione del sangue**) possono influenzare la velocità con cui TAMSULOSIN DOC Generici viene rimosso dall'organismo.

E' particolarmente importante informare il suo medico nel caso in cui stia assumendo nello stesso tempo altri medicinali che possono diminuire la rimozione di TAMSULOSIN DOC Generici dal corpo (per esempio, **ketoconazolo**, **eritromicina**).

Tenga presente che quanto esposto sopra può essere valido anche per prodotti impiegati in un passato più o meno recente oppure da impiegarsi in un futuro più o meno prossimo.

TAMSULOSIN DOC Generici con cibi e bevande

L'assunzione di TAMSULOSIN DOC Generici deve avvenire dopo la **colazione** o dopo il primo pasto della giornata, mentre prenderlo a **stomaco** vuoto può portare a un aumento degli effetti indesiderati o della gravità di uno di questi.

AvvertenzeÈ importante sapere che:

Gravidanza, allattamento e fertilità

TAMSULOSIN DOC Generici non è indicato nelle donne.

Nell'uomo è stata riportata **eiaculazione** anomala (disturbi dell'ejaculazione). Questo significa che il **liquido seminale** non fuoriesce dal corpo tramite l'uretra ma entra nella **vescica** (**ejaculazione retrograda**) o che il volume di eiaculazione è ridotto o assente (mancata eiaculazione). Questo evento è innocuo.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Sino ad ora non sono state riscontrate evidenze che la tamsulosina alteri la capacità di guidare o di usare macchinari.

Tuttavia, deve essere consapevole del fatto che possono verificarsi **capogiri**; in tal caso non deve intraprendere quelle attività che richiedono attenzione.

Dose, Modo e Tempo di Somministrazione

Come usare Tamsulosin:

Posologia

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi, consulti il medico o il farmacista.

Il medicinale è per uso orale.

La dose raccomandata è di una **capsula** al giorno dopo colazione oppure dopo il primo pasto della giornata. La capsula deve essere presa stando in piedi o seduti (non distesi) e deve essere **deglutita** intera con un bicchiere d'**acqua**.

La capsula non deve essere frantumata o masticata poiché ciò interferisce con il rilascio modificato del principio attivo.

Normalmente TAMSULOSIN DOC Generici viene prescritto per lunghi periodi di tempo. Gli effetti sulla **vescica urinaria** e sulla **minzione** vengono mantenuti a seguito di un trattamento a lungo termine con la tamsulosina.

Il medico presso il quale è in cura ha prescritto una dose adatta a lei e alla malattia di cui soffre, specificando la durata del trattamento. Non modifichi tale dose di sua iniziativa.

Qualora abbia l'impressione che l'effetto di tamsulosina sia troppo forte o troppo debole, ne parli con il medico o il farmacista.

Sovradosaggio Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di Tamsulosin

Se prende più TAMSULOSIN DOC Generici di quanto deve

Se prende più TAMSULOSIN DOC Generici del dovuto, contatti subito il medico o il farmacista. L'assunzione di una dose eccessiva di tamsulosina può indurre un calo non voluto della pressione sanguigna ed un aumento della **frequenza cardiaca**, associati a sensazione di debolezza. Potrebbero in tal caso presentarsi **vertigine**, debolezza, **vomito**, **diarrea** e svenimento. Si sdrai per minimizzare gli effetti dell'abbassamento della pressione sanguigna.

Se dimentica di prendere TAMSULOSIN DOC Generici

Qualora si sia dimenticato di prendere una dose di TAMSULOSIN DOC Generici dopo colazione o dopo il primo pasto della giornata, può farlo quando se ne accorge dopo aver ingerito del **cibo**. Se ha saltato un giorno, continui semplicemente a prendere la dose giornaliera come le è stato prescritto. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con TAMSULOSIN DOC Generici

Quando il trattamento con TAMSULOSIN DOC Generici viene interrotto prematuramente, possono ricomparire i sintomi iniziali. Pertanto continui ad assumere TAMSULOSIN DOC Generici per tutto il periodo di tempo prescritto dal medico, anche se i suoi sintomi sono già scomparsi. Consulti sempre il suo medico se crede che questa terapia debba essere interrotta.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

Effetti Indesiderati Quali sono gli effetti collaterali di Tamsulosin

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati suddivisi in base alla probabilità con cui si possono manifestare:

Effetti comuni (si manifestano in più di 1 paziente su 100, ma in meno di 1 su 10): capogiri (particolarmente mettendosi a sedere o alzandosi in piedi). **Eiaculazione anomala (disturbi dell'eiaculazione). Questo sintomo significa che il liquido seminale non esce all'esterno del corpo attraverso l'uretra ma entra nella vescica urinaria (eiaculazione retrograda) o che il volume di liquido seminale è ridotto o assente (mancata eiaculazione). Questo evento è innocuo.**

Effetti non comuni (si manifestano in più di 1 paziente su 1000, ma in meno di 1 su 100): **mal di testa**, **palpitazioni** (sentire il cuore battere più rapidamente del normale), irregolare riduzione della pressione sanguigna ad esempio alzandosi in piedi velocemente da seduti o da sdraiati spesso associata a **vertigini**, **naso chiuso** o gocciolante (**rinite**), **stitichezza**, **diarrea**, **nausea**, vomito, arrossamento **cutaneo** (rash), prurito, arrossamento della **pelle** (**orticaria**), sensazione di debolezza (**astenia**).

Effetti rari (si manifestano in più di 1 paziente su 10.000, ma in meno di 1 su 1000): senso di mancamento (svenimento); **improvviso gonfiore localizzato dei tessuti molli** del corpo (ad esempio della gola e della lingua) e delle mani e/o dei piedi, **respiro difficoltoso** con o senza prurito e arrossamento cutaneo (rash), come di frequente in una reazione allergica (angioedema).

Effetti molto rari (si manifestano in meno di 1 un paziente su 10.000): grave eruzione cutanea, **infiammazione**, formazione di **vesciche** sulla pelle e/o sulle **muose** di **labbra**, occhi, bocca, narici o genitali (**sindrome di Stevens-Johnson**); **erezione** involontaria, prolungata e dolorosa che richiede un immediato trattamento medico (**priapismo**).

Effetti con frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili): **visione offuscata**, **compromissione della vista**, perdita di **sangue dal naso** (**epistassi**), gravi eruzioni cutanee (**eritema multiforme**, **dermatite esfoliativa**), **secchezza delle fauci**, **ritmo cardiaco** irregolare anomalo (**fibrillazione atriale**, **aritmia**, **tachicardia**), **difficoltà respiratoria** (**dispnea**). **Se sta per essere sottoposto ad intervento chirurgico agli occhi per opacità del cristallino (cataratta) o aumento della pressione dell'occhio (glaucoma) e se sta già prendendo o ha recentemente preso TAMSULOSIN DOC Generici, la pupilla può dilatarsi scarsamente e l'iride (la parte circolare colorata dell'occhio) può diventare flaccida durante l'intervento.**

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.aifa.gov.it/responsabili.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

Scadenza e Conservazione

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

- Blister: conservare nella confezione originale.
- Contenitore per compresse: mantenere il flacone ben chiuso.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sul blister o sul flacone e sulla scatola dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Composizione e forma farmaceutica

Cosa contiene TAMSULOSIN DOC Generici

Il principio attivo è tamsulosina cloridrato 0,4 mg.

Gli altri componenti sono:

Contenuto della capsula: [cellulosa microcristallina](#), acido metacrilico - etilacrilato copolimero (1:1), [polisorbato 80](#), sodiolaurilsolfato, trietile [citrato](#), [talco](#).

Corpo della capsula: [gelatina](#), indigotina (E132), titanio diossido (E171), ossido di [ferro](#) giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro nero (E172).

Inchiostro: [gomma](#) lacca, ossido di ferro nero (E172), propilenglicole.

Descrizione dell'aspetto di TAMSULOSIN DOC Generici e contenuto della confezione

Le [capsule](#) di TAMSULOSIN DOC Generici sono di colore arancio/verde [oliva](#) con una striscia nera su entrambe le estremità e la scritta "TSL 0.4" in nero sulla capsula.

Le confezioni disponibili sono blister o contenitori per compresse da 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 o 200 capsule.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Fonte Foglietto Illustrativo: AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). Contenuto pubblicato a Gennaio 2016. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'[AIFA](#) (Agenzia Italiana del Farmaco). [Disclaimer e informazioni utili](#).

Tratto da <https://www.my-personaltrainer.it/Foglietti-illustrativi/Tamsulosin.html>